



INSTRUCCIONES DESPUES DE LA SEDACION

Su hijo debe ser observado por las siguientes horas después del tratamiento hecho hoy. Por favor siga nuestras recomendaciones. Por favor siga nuestras recomendaciones.

SINTOMAS: Los síntomas que su hijo puede experimentar después del tratamiento son los siguientes:

- Fatiga, cansancio, sueño
- Mareo y falta de coordinación
- Niños menores tienden a irritarse con facilidad ya que tratan de combatir el cansancio
- Picazón en la nariz

Estos síntomas duran entre 2 a 6 horas después de salir del consultorio.

Observe labios/mejillas/lengua en caso de que presenten algún tipo de piquita o irritación en la cara por causa de la anestesia local. El estomago de su hijo puede sentirse un poco resentido por unas horas después del tratamiento. Si su hijo presenta vomito, mantenga la garganta despejada sosteniendo la cabeza hacia abajo o a un lado durante el vomito. La temperatura de su hijo puede ser elevada a 101°F/38°C por las primeras 24 horas después del tratamiento. Si su hijo presenta vomito, mantenga la garganta despejada sosteniendo la cabeza hacia abajo o a un lado durante el vomito. La temperatura de su hijo puede ser elevada a 101°F/38°C por las primeras 24 horas después del tratamiento. Tylenol cada 3-4 horas y líquidos ayudaran a aliviar esta condición. Si su hijo presenta fiebre arriba de 101°F/38°C por favor notifique al consultorio.

LLEGANDO A LA CASA:

Por favor use el cinturón de seguridad con su niño cuando vaya conduciendo a su casa. Le recomendamos que traiga otra persona con usted para que cuide a su hijo mientras que usted conduce a casa.

EN CASA:

Es mejor que mantenga a su hijo despierto por dos horas después del tratamiento. Su hijo puede encontrarse desorientado y puede tambalearse al caminar por un par de

horas. Mire cuidadosamente y no deje a su hijo sin ninguna supervisión por el resto del día. Su hijo podrá regresar a la escuela o guardería al día siguiente.

SIESTA:

La mayoría de niños tienden a dormir una vez llegan a casa. Suavemente despiértelo/la, pero no se preocupe si el/ella decide volver a dormir y toma una siesta de 4-5 horas. No permita que su hijo duerma con la barbilla hacia abajo contra el pecho ya que esto puede hacer que su hijo no respire adecuadamente.

ACTIVIDADES:

Si su hijo regresa a casa y no desea dormir, no se preocupe - cada niño actúa de forma diferente. Asegúrese de supervisar todas las actividades de su hijo si no está durmiendo. Cuidado extra es necesario. No permita que su hijo realice ningún tipo de actividad (correr, saltar, escalar, salir, etc.). Procure que el día de la cita sea lo más callado y calmado posible. No envíe a su hijo a la escuela el mismo día de su cita con nosotros.

COMER Y BEBER:

Como le pedimos que no le diera ningún tipo de alimento o bebida a su hijo 6 horas antes de consulta, el/ella se puede sentir con hambre. Retrase todo tipo de comida sólida hasta que el entumecimiento y la anestesia local hayan pasado. Cuando su hijo está con anestesia el/ella tiende a morderse los labios, mejillas y lengua. Observe cuidadosamente hasta que la anestesia pase. Después del tratamiento, la primera bebida debe ser agua en cantidades pequeñas. Jugos de fruta pueden darse después. Cantidades pequeñas de líquidos son más recomendadas que grandes cantidades. Comidas suaves, pero no muy calientes, pueden ser ingeridas cuando su hijo lo desee. Evite comidas pesadas por el resto del día.

CUANDO BUSCAR POR AYUDA:

1. Si el vomito continua por mas de 4 horas.
2. Si la fiebre permanente arriba de 101°F/38°C por mas de 24 horas.
3. Si su hijo presenta dificultades al respirar o su hijo se encuentra extremadamente somnoliento en el día, llame a Dr. Davis y/o Dr. Shingler al 703-754-1580. Si Dr. Davis y/o Dr. Shingler no pueden ser

contactados inmediatamente, usted debe buscar asistencia médica de emergencia.

4. Si usted tiene alguna otra duda.